Vigente desde: Agosto 2020	Ficha Técnica DETIA RATICIDA PLUS BLOQUE 0,005%	Reemplaza a: Julio 2020

TIPO	Raticida
INGREDIENTE ACTIVO	Brodifacoum ($C_{31}H_{23}BrO_3$)
GRUPO QUIMICO	Cumarina
CONCENTRACIÓN	0,005 % p/p
FORMULACION	Mini Bloque y Tabletas
FABRICANTE / FORMULADOR	Garda GmbH, Detia Degesch Group (Alemania).

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

-Estado físico: Sólido
-Apariencia: Mini bloque y Tabletas
-Densidad relativa: No aplicable
-Solubilidad en agua: Insoluble
-Corrosividad: No Corrosivo.

MODO DE ACCION	Ingestión. Brodifacoum actúa en el organismo del roedor inhibiendo la formación de protombina, necesaria para la coagulación de la sangre, lo cual deriva en hemorragias múltiples y fatales.
TOXICIDAD	**Grupo IV** **Cuidado, banda verde**
ANTÍDOTO	Vitamina K1
Nº DE REGISTRO ISP	Detia raticida plus bloque: P-426/20
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	- Rodenticida químico anticoagulante de segunda generación. Esto significa que el roedor requiere de una sola ingesta para consumir su dosis letal. - Es eficaz para el control de ratas y ratones. - Para uso en interiores y/o exteriores. Ideal para el control de todas las especies. - Su uso está indicado para aquellos casos en los que los roedores estén consumiendo e infestando granos o alimentos similares (molinos, acopios, etc.), ya que disminuye la neofobia, característica de los roedores comensales. - Contiene benzoato de denatonio (amargante), lo que previene la ingesta accidental de niños y mascotas. - No es corrosivo ni inflamable.
RECOMENDACIONES DE USO	Detia Raticida tiene un buen desempeño en condiciones externas de temperatura y humedad; y puede ser utilizado tanto en espacios interiores como en exteriores. Tan pronto como aparezcan las primeras señales de infestación, comenzar la aplicación del cebo, localizar las sendas, madrigueras y agujeros (áreas de actividad) de los roedores y situar los cebos en lugares cubiertos; puesto que las ratas y ratones comen en lugares escondidos. Se debe vigilar y monitorear los

	cebaderos y reponer los cebos comidos, de manera continúa por espacio de 2 meses, hasta que cese el consumo. Cuando ratas o ratones no coman más cebo se deben recoger los restos y retirar de forma inmediata los roedores muertos y moribundos, para evitar envenenamientos secundarios.
ENVASES	- Cajas de 10 kilos - Cajas de 12,5 kilos - Cajas de 500 gramos - Cada minibloque pesa 10 g. - Cada tableta pesa 25 g.

Cuadro de Dosificación

Por cada cebadero	Cantidad	Distancia
Ratas (*género Rattus*)	1 - 2 minibloques 1 - 2 tabletas	5 a 10 mts.
Ratones (género *Mus*)	1 minibloque 1 tableta	2 a 3 mts.

***** Las distancias entre los puntos de cebamiento o dosificación disminuyen a mayor grado de ingesta de roedores.

