



Nombre	Roedofin cebo bloque
Composición	Brodifacoum 0,005% p/p
Clasificación toxicológica	Clase IV OMS, poco probable peligro en su uso normal
Antídoto	Vitamina K1 (Fitomendadiona)
Prevención ingesta humana	Benzoato de Denatonio 0,001%
Presentaciones	Envases de 250 gr. y 10 kg
Registro Instituto de Salud Pública	P-978/22

ROEDOFIN CEBO BLOQUE es un rodenticida anticoagulante potente de última generación que controla eficazmente lauchas o ratones comunes, guarenes o ratas de alcantarillo y retas de tejado o rata negra, en interiores, alrededor de edificaciones y áreas abiertas, vertederos. Especial para tratamientos con resistencia a otros raticidas clásicos.

ROEDOFIN CEBO EN BLOQUE contiene Benzoato de Denatonio al 0,001%, amargante que previene la ingestión humana accidental, aumentando la seguridad en su uso y no siendo detectado por los roedores.

FORMA DE ACCION: a muy pequeñas dosis Roedofin cebo bloque, interfiere en la coagulación de la sangre.

TIPO DE FORMULACION

Composición:

Brodifacoum (CAS N° 56073-10-0)	0,005 g
Excipientes c.s.p.	100,00 g
Benzoato de Denatonio	0,001%
Grupo químico	Hidroxycumarina

Bloque

PRECAUCIONES DE USO: Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso. Usar guantes protectores resistentes a productos químicos durante la fase manipulación. No se debe aplicar en áreas donde los alimentos para personas, alimentos para animales, bebidas, utensilios de cocina o las superficies de procesamiento de alimentos puedan entrar en contacto con el producto o bien ser contaminados por el mismo. Durante el uso del producto no comer, beber o fumar. Lavar bien las manos y áreas de piel expuestas después de utilizar el producto.

RECOMENDACIONES DE USO: el producto debe ser colocado en las inmediaciones de los lugares donde se ha observado actividad de roedores (zonas de paso, sitios de anidación, cebaderos, agujeros, madrigueras). El portacebos debe estar fijado al suelo o a otras estructuras. No manipular el cebo sin guantes.

INTRUCCIONES DE USO: aplicar en portacebos correctamente etiquetados. El producto se presenta listo para su utilización:

Uso	Roedor	Dosis	Observaciones
Interior	Lauchas o ratones comunes (<i>Mus musculus</i>). Guarenes o ratas de alcantarilla o ratas pardas (<i>Rattus norvegicus</i>) Ratas de tejado o rata negra (<i>Rattus rattus</i>)	Ratas: 15 – 30 g de cebo por punto de portacebo.	Para ratas y ratones en interior: cebo listo para su uso en portacebos resistentes a la manipulación. Instalados a una distancia entre 3 a 5 metros.
Exteriores (Alrededor de edificaciones)		Ratones: 10 – 20 g de cebo por punto de portacebo.	Para Ratas y/o ratones alrededor de edificaciones: cebo está listo para su uso en portacebos resistentes a la manipulación. Aplicación directa para su uso en madrigueras.
Áreas abiertas, vertederos	Guarenes o ratas de alcantarilla o ratas pardas (<i>Rattus norvegicus</i>) Ratas de tejado o rata negra (<i>Rattus rattus</i>)	Ratas: 15 – 30 g de cebo por punto de portacebo.	Para ratas en áreas abiertas, vertederos: cebo listo para su uso en portacebos resistentes a la manipulación. Aplicación directa para su uso en madrigueras. Instalados a una distancia entre 3 a 5 metros.

SINTOMAS DE INTOXICACION Y PRIMEROS AUXILIOS: este producto contiene una sustancia anticoagulante. En caso de ingestión, los síntomas, pueden hacerse evidentes hasta en un plazo de 72 horas. Las manifestaciones clínicas pueden incluir sangrado de nariz y encías. En casos severos, puede haber moretones y presencia de sangre en heces u orina.

- En caso de contacto con los ojos, compruebe siempre la presencia de lentes de contacto y retírelas, separe los párpados y lave con abundante agua limpia por 10 a 15 minutos. Acuda al médico.
- En caso de contacto con la piel, lavar la piel con agua y a continuación con agua y jabón.
- Si accidentalmente el producto es ingerido, NO provoque el vómito y lleve a la persona junto con este envase, inmediatamente al médico.
- En cualquier caso, acudir al Centro Asistencial más cercano.
- Contacte con un Veterinario en caso de que lo ingiera una mascota.

Tratamiento médico/antídoto: Vitamina K1 administrada únicamente por personal médico/veterinario.

MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE: los portacebos deben etiquetarse con la información “no mover o abrir”. “contiene rodenticida”, “nombre del producto o número de autorización” sustancia(s) activa(s); en caso de accidente, llamar a: Centro Toxicológico CITUC Fono: +56-2-26353800. (atención las 24 horas los 365 días del año)

Peligroso para la fauna silvestre.

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR: Pest Store Ltda., Fuenzalida Urrejola 505, la Cisterna, WWW.PESTSTORE.CL, fono: 229962530, email: gerencia@peststore.cl, Santiago - Chile

FABRICANTE: Química de Munguía S.A. (QUIMUNSA). Derio Bidea 51, 48100 Munguía. España